

Program použití od porodu až k připouštění



***DELIBOL a
METRABOL
a následné
řešení přípravy
na reprodukci***



GROUPE **TECHNA**

Route de St-Étienne-de-Montluc (D101)
BP 10 - 44220 COUËRON - FRANCE
Tél. 33 (0)2 40 85 41 41 - Fax : 33 (0)2 40 86 44 32
www.groupe-techna.com

Použití programu Delibol a Métrabol :



U všech zvířat a speciálně

- ✓ Všechny prvotelky
- ✓ Všechna zvířata, u kterých se muselo ručně asistovat u porodu
- ✓ U všech porodů dvojčat, císařským řezem, u dystorzií

Kdy použít bolus :


- ❑ Jedna společná aplikace : 1 bolus « vypuzení lůžka » + 1 bolus « prevence metritíd a endometritíd », podejte v prvních 24 hodinách po porodu

Je doporučeno podávat bolus co nejrychleji po porodu (v prvních 6 – 8 hodinách)

Přirozené vypuzení lůžka (placenty)



Účinnost programu Metrabol podle času podání bolusu po porodu




Praktické použití v chovu :



Všechna zvířata


2 bolusy (1 Delibol a 1 Metrabol) nahrazují :

- Injekce antibiotik v den porodu
- Vymývání dělohy (antiseptické čištění) po porodu
- Podávání antibiotik vnitroděložně (čípky, tekuté prostředky)
- Injekce antibiotik a prostaglandinů 10 až 20 den po porodu



Vypuzení lůžka se přirozeně děje mezi 1 až 5 dnem po porodu


Praktické použití v chovu :



Je důrazně doporučeno použít současně Delibol a Metrabol

Důležité doporučení :

- Nevytahujte násilím placentu (je možné ji odstranit až z vulvy)
- Nedoporučuje se provádět manuální zásahy v genitálním aparátu v období 0-30 dnů




Přítomnost výtoku mezi 0 až 15 dnem po porodu je normální.

Praktické použití v chovu :



Následné použití bolusu FERTIBOL nebo přípravku FECONDITRAL pro přípravu na říji, doprovázené před inseminací přípravkem OVULITRAL



Cíle použití programu METRABOL



Použití programu METRABOL napomáhá

**omezit používání antibiotik
a hormonů a zlepšit březost**